

KỸ THUẬT GIEO TRỒNG GIỐNG NGÔ LAI LVN17

Nguồn gốc: LVN17 là giống ngô lai đơn do Viện Nghiên Cứu Ngô lai tạo.

I. ĐẶC TÍNH GIỐNG

- Chín trung bình sớm (thời gian sinh trưởng 95 – 110 ngày)
- Năng suất cao, ổn định (10 - 12 tấn/ha)
- Bắp to cùi nhỏ, hạt sâu cay, màu vàng cam.
- Chiều cao cây (cm): 200 – 220.
- Đường kính bắp (cm): 5 – 5,5 cm.
- Số hàng hạt: 14 - 16.
- Trọng lượng 1000 hạt (g): 320 – 330.
- Đóng bắp đầy, lá bi bao kín bắp.
- Chịu hạn, chịu rét, chống đổ tốt, ít nhiễm sâu bệnh.
- Khả năng thích ứng rộng.

II. KỸ THUẬT GIEO TRỒNG.

1. Thời vụ.

Vụ xuân : từ 20/1 – 20/2.

Vụ hè thu: từ 15/5 – 15/6.

Vụ đông: từ 5/9 – 30/9

Căn cứ vào thời vụ tốt nhất của địa phương để tránh khi cây ngô trở cò gặp thời tiết khô hạn, nắng nóng.

2. Đảm bảo mật độ: 6,5 - 7 vạn cây/ha (1700 - 2000 cây/sào bắc bộ) tương ứng với khoảng cách 65cm x 25cm.

3. Bón phân đủ liều lượng và đúng cách.

Với phân đơn:

2,5 – 3 tấn hữu cơ vi sinh/ha (90 – 108 kg/sào bắc bộ)

250 – 300 kg đạm Ure/ha (9 -11kg/sào bắc bộ)

400 – 500 kg Supe lân/ha (14 – 18 kg/sào bắc bộ)

120 – 150 kg Kali clorua/ha (4 – 5 kg/sào bắc bộ)

Cách bón:

- Bón lót: toàn bộ phân vi sinh và phân lân khi gieo hạt.
- Bón thúc: chia làm 3 lần.

Lần 1: Khi ngô 3 -4 lá bón $\frac{1}{4}$ lượng đạm Ure + $\frac{1}{3}$ lượng Kali kết hợp xới phá văng.

Lần 2: Khi ngô 9 – 10 lá bón $\frac{1}{2}$ lượng đạm Ure + $\frac{1}{3}$ lượng Kali vùn cao, chống đổ.

Lần 3: Trước khi trổ 7 – 10 ngày bón lượng đạm và Kali còn lại.

**Với phân tổng hợp NPK.*

2,5 3 tấn hữu cơ vi sinh (90 – 108 kg/ sào bắc bộ)

NPK (5:10:3) 700kg/ha (25kg/sào bắc bộ).

NPK (12:5:10): 450kg/ha (16kg/sào bắc bộ).

Đạm Ure: 4- 50 kg/ha (1,5 – 1,8kg/sào bắc bộ).

Kaliclorua: 30 – 40 kg/ha (1,1 – 1,5 kg/sào bắc bộ).

Cách bón:

- Bón lót: toàn bộ phân vi sinh và 700kg/ha phân NPK (5:10:3).
- Bón thúc lần 1: khi cây ngô 5 – 7 lá bón 250kg/ha phân NPK (12:5:10) +40 – 50kg/ha đạm Ure, kết hợp làm cỏ, xới vùn gốc.
- Bón thúc lần 2: khi cây ngô bắt đầu xoắn nõn bón 200kg NPK (12:5:10) + 30 – 40kg/ha Kaliclorua, kết hợp xới, vùn cao chống đổ.

III. Chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh.

- Tập trung chăm sóc tốt vào giai đoạn cây con.
- Tỉa định cây đảm bảo mật độ.
- Đảm bảo đủ nước khi cần thiết, đặc biệt trước và sau khi trổ cờ.
- Phòng trừ sâu đục thân bằng Basudin 10H rắc vào nõn 4 – 5 hạt.

IV. Thu hoạch.

- Thu hoạch đúng độ chín khi lá bi khô và chân hạt xuất hiện điểm đen.

Lưu ý: Hạt giống đã được xử lý hóa chất. Không ăn được.

Không sử dụng hạt thương phẩm làm giống cho vụ sau.